

A 2008 MATH. I PC

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES.

ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES  
DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE,  
DE TECHNIQUES AVANCÉES,  
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS,  
DES MINES DE PARIS,  
DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE,  
DES MINES DE NANCY,  
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BRETAGNE.  
ÉCOLE POLYTECHNIQUE (FILIÈRE TSI).

CONCOURS D'ADMISSION 2008

**PREMIÈRE ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES**

**Filière PC**

(Durée de l'épreuve : 3 heures)

**L'usage d'ordinateur ou de calculatrice est interdit.**

**Sujet mis à la disposition des concours :**  
**ENSTIM, TELECOM SudParis (ex TELECOM INT), TPE-EIVP, Cycle international**

*Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie :*

*MATHÉMATIQUES I - PC*

*L'énoncé de cette épreuve comporte 4 pages de texte.*

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

## Translations dans des espaces de fonctions

---

La partie III est indépendante des deux premières.

### I Préliminaires

Pour  $n \in \mathbf{N}$ ,  $\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$  un ensemble de  $n + 1$  complexes distincts et pour  $i$  entier compris entre 0 et  $n$ , on définit le polynôme  $L_i$  par :

$$L_i(X) = \prod_{0 \leq j \leq n, j \neq i} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}.$$

1. Montrer que les polynômes  $L_i$  forment une base de  $\mathbf{C}_n[X]$ .
2. Écrire la matrice  $M$  du système  $\{1, X, X^2, \dots, X^n\}$  dans la base  $\{L_0, L_1, \dots, L_n\}$ .

### II Fonctions polynomiales

Dans cette partie, on note  $k$  un entier naturel fixé et  $E$  l'espace vectoriel des polynômes à coefficients complexes de degré inférieur ou égal à  $k$ . Pour  $a \in \mathbf{C}^*$ , on définit

$$\begin{aligned} t_a : E &\longrightarrow E \\ P &\longmapsto (X \mapsto P(X + a)). \end{aligned}$$

Pour  $P \in E$ , on note  $d(P)$  le polynôme dérivé :

$$\begin{aligned} d : E &\longrightarrow E \\ P &\longmapsto P'. \end{aligned}$$

Pour  $k \geq 2$ , on pose  $d^k = d^{k-1} \circ d = d \circ d^{k-1}$ . On tiendra pour acquis que  $t_a$  et  $d$  sont des endomorphismes de  $E$ . On désignera par  $\mathcal{B} = \{e_0, e_1, \dots, e_k\}$  la base de  $E$  définie par  $\{1, X, X^2, \dots, X^k\}$ .

3. Écrire les matrices, notées respectivement  $T_a$  et  $D$ , des endomorphismes  $t_a$  et  $d$  dans la base  $\mathcal{B}$ .
4. En déduire les éléments propres de ces endomorphismes. On donnera les valeurs propres, les espaces propres correspondants ainsi que leurs dimensions.

5. Quels sont les sous-espaces vectoriels de  $E$  stables par  $d$ ? Donner leur nombre.  
*Indication : on pourra considérer un polynôme de degré maximal dans  $F$ , sous-espace stable.*

6. Soit  $P(X) = \sum_{i=0}^k p_i X^i$  un polynôme fixé de degré  $k$  ( $p_k \neq 0$ ). Montrer que le système

$$\left\{ P, \frac{d(P)}{1!}, \frac{d^2(P)}{2!}, \dots, \frac{d^k(P)}{k!} \right\}$$

constitue une base  $\mathcal{B}_1$  de  $E$ . Donner la matrice de passage  $R$  de  $\mathcal{B}$  vers  $\mathcal{B}_1$ .

7. Pour  $a \in \mathbf{C}^*$ , exprimer les coordonnées du système

$$S = \{P(X), P(X+a), P(X+2a), \dots, P(X+ka)\}$$

dans la base  $\mathcal{B}_1$ . On note  $U$  la matrice ainsi obtenue. En déduire que  $S$  constitue une base de  $E$  qu'on notera  $\mathcal{B}_2$ .

8. On note  $Q$  la matrice de passage de  $\mathcal{B}$  vers  $\mathcal{B}_2$ . Exprimer  $Q$  en fonction de  $R$  et  $U$ .

9. Pour  $a$  fixé dans  $\mathbf{C}^*$ , caractériser les sous-espaces vectoriels de  $E$  stables par  $t_a$ .

### III Fonctions continues, $2\pi$ -périodiques

Dans cette partie,  $E$  désigne l'espace vectoriel des fonctions complexes continues sur  $\mathbf{R}$  et  $2\pi$ -périodiques. Pour  $f \in E$ , on désignera par  $c_n(f)$  la suite (indexée sur  $\mathbf{Z}$ ) des coefficients de Fourier de  $f$  : pour tout entier relatif  $n$ ,

$$c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx.$$

Pour tout entier relatif  $k$ , on notera  $e_k$  la fonction

$$e_k : x \mapsto \exp(ikx).$$

Pour  $a \in \mathbf{R}$  et  $f \in E$ , on note  $t_a(f)$  la fonction à valeurs dans  $\mathbf{C}$  définie

$$t_a(f) : x \mapsto f(x+a).$$

Cela nous permet de définir l'endomorphisme  $t_a$  de  $E$  :

$$\begin{aligned} t_a : E &\longrightarrow E \\ f &\longmapsto t_a(f). \end{aligned}$$

Pour tout réel  $a$ , on définit la fonction  $\phi_a$  par

$$\begin{aligned}\phi_a : \mathbf{Z} &\longrightarrow \mathbf{C} \\ n &\longmapsto \exp(ina).\end{aligned}$$

10. Préciser les réels  $a$  pour lesquels la fonction  $\phi_a$  est injective. Dans le cas contraire, montrer que  $\phi_a$  est périodique.
11. Pour  $f \in E$ , donner les valeurs de la suite  $c_n(t_a(f))$  en fonction des valeurs prises par la suite  $c_n(f)$ .
12. Donner les valeurs propres de  $t_a$ . Caractériser les valeurs de  $a$  pour lesquelles les espaces propres de  $t_a$  sont tous de dimension 1.
13. Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension finie  $p \geq 1$  et stable par  $t_a$ . Soit  $f \in F$ ,  $f$  non nul, montrer qu'il existe  $p + 1$  scalaires  $\alpha_j$  non tous nuls tels que pour tout entier relatif  $n$ ,

$$\left( \sum_{j=0}^p \alpha_j \exp(inaj) \right) c_n(f) = 0.$$

14. Soit  $a$  réel fixé tel que  $a/\pi$  soit irrationnel. Soit  $f$  appartenant à  $F$ , montrer qu'il existe un entier  $N_f$  tel que  $c_n(f) = 0$  pour  $|n| \geq N_f$ .
15. Montrer qu'il existe un entier  $N$  tel que pour tout  $g$  appartenant à  $F$ ,  $c_n(g) = 0$  pour  $|n| \geq N$ .
16. Soit  $G$  le sous-espace vectoriel de  $E$  engendré par  $(e_k, k = -N, \dots, N)$ . Vérifier que  $F \subset G$  et  $G$  stable par  $t_a$ .
17. L'endomorphisme  $t_a$  restreint à  $G$  est-il diagonalisable ?
18. Montrer qu'on peut trouver un ensemble fini  $S$  d'entiers relatifs tel que  $F$  soit le sous-espace vectoriel engendré par les  $e_k$  pour  $k$  décrivant  $S$ .

FIN DU PROBLÈME